

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**  
**СУЛЬФАЦИЛ-НАТРИЯ**

**Регистрационный номер:** Р N001084/01

**Торговое наименование:** Сульфацил-натрия

**Международное непатентованное наименование:** сульфацетамид

**Лекарственная форма:** капли глазные.

**Состав**

1 мл раствора содержит:

Действующее вещество:

сульфацетамид натрия (сульфацил-натрия) - 200 мг.

Вспомогательные вещества:

натрия тиосульфат - 1,0 мг, хлористоводородная кислота (соляная кислота) - до pH 7,5 - 8,7, вода очищенная - до 1 мл.

**Описание:** прозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость.

**Фармакотерапевтическая группа:** противомикробное средство, сульфаниламид.

**Код АТХ:** S01AB04

**Фармакологическое действие**

Противомикробное бактериостатическое средство, сульфаниламид. Механизм действия обусловлен конкурентным антагонизмом с пара-аминобензойной кислотой, угнетением дигидроптероатсинтетазы, нарушением синтеза тетрагидрофолиевой кислоты, необходимой для синтеза пуринов и пиримидинов.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных кокков, *Escherichia coli*, *Shigella* spp., *Vibrio cholerae*, *Clostridium perfringens*, *Bacillus anthracis*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Yersinia pestis*, *Chlamydia* spp., *Actinomyces israelii*, *Toxoplasma gondii*.

**Фармакокинетика**

Проникает в ткани и жидкости глаза. Всасывается в системный кровоток через воспаленную конъюнктиву.

**Показания**

Конъюнктивит, блефарит, гнойная язва роговицы, профилактика и лечение бленнореи у новорожденных, гонорейные и хламидийные заболевания глаз у взрослых.

**Противопоказания**

Индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

**Способ применения и дозы**

Закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 5-6 раз в сутки. Для профилактики бленнореи у новорожденных закапывают по 1 капле раствора в каждый глаз троекратно с интервалом 10 минут.

#### **Побочное действие**

Жжение, слезотечение, резь, зуд в глазах, аллергические реакции.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Совместное применение с прокаинам и тетракаином снижает бактериостатический эффект. Несовместим с солями серебра.

#### **Особые указания.**

Пациенты, обладающие повышенной чувствительностью к фуросемиду, тиазидным диуретикам, сульфонилмочевине или ингибиторам карбоангидразы могут иметь повышенную чувствительность к сульфацетамиду.

#### **Форма выпуска**

Капли глазные 20 %.

По 1,5 мл в тубик-капельницы полимерные из полиэтилена высокого давления.

2 тубик-капельницы вместе с инструкцией по применению препарата в пачку из картона.

На пачку наносят текст и графическое изображение (пиктограммы) инструкции по применению тубик-капельницы.

По 5 мл во флакон-капельницы полимерные из полиэтилена высокого давления.

1 флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению препарата в пачку из картона.

На пачку наносят текст и графическое изображение (пиктограммы) инструкции по применению флакон-капельницы.

#### **Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С для препарата в тубик-капельницах.

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С для препарата во флакон-капельницах.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

3 года.

Срок годности препарата после вскрытия - 7 суток (для препарата в тубик-капельницах);

Срок годности препарата после вскрытия - 1 месяц (для препарата во флакон-капельницах).

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

#### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель:**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод»

*Производство готовой лекарственной формы:*

г. Москва, ул. Новохоловская, д. 25, стр. 2

*Выпускающий контроль качества:*

г. Москва, ул. Новохоловская, д. 25, стр. 1

**Владелец регистрационного удостоверения/наименование, адрес организации, принимающей претензии потребителя:**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод»

Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 25

Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10

<http://www.endopharm.ru>